

**Graviditet:** i.v.-jernpræparater bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis du er gravid eller mener, du kan være gravid, er det vigtigt at drøfte dette med din læge.

**Du skal omgående tale med din læge eller sygeplejerske, hvis:**

- du har tegn eller symptomer på en allergisk reaktion under eller kort tid efter behandling med et i.v.-jernpræparat

For eksempel nældefeber eller udslæt, kløe, svimmelhed, ørhed, hævelse af læber, tunge, hals eller krop, vejrtrækningsbesvær, kortåndethed eller hvæsende vejrtrækning.

Din læge og sundhedspersonalet er bekendt med disse mulige bivirkninger, og du vil blive overvåget under og efter behandling med et i.v.-jernpræparat.

**Indberetning af bivirkninger**

Du kan hjælpe med at indberette enhver bivirkning, som du får. Hvis du får bivirkninger, skal du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

# Intravenøst (i.v.) jernpræparat

**Vigtig information til patienter om den mulige risiko for alvorlige allergiske reaktioner ved behandling med i.v.-jernpræparater (jern indgivet ved infusion eller injektion i en blodåre)**

ferriccarboxymaltose, jern-dextrans, jern-derisomaltose, jernsaccharose

**Læs denne indlægsseddel grundigt og drøft alle spørgsmål, som du har, med din læge.**

**Du skal læse indlægssedlen, som medfølger med det specifikke i.v.-jernpræparat, som du har fået ordineret. Den indeholder vigtig information om præparatet.**

**Et i.v.-jernpræparat** anvendes til behandling af jernmangel, når jernpræparater, der indtages gennem munden, ikke kan anvendes. Formålet med behandlingen er at genopfylde kroppens jernreserver.

**i.v.-jernpræparater** kan forårsage allergiske reaktioner. Hos et lille antal patienter kan disse allergiske reaktioner blive alvorlige eller livstruende (kendes som anafylaktiske reaktioner) og kan forårsage problemer med hjertet og blodtrykket og/eller føre til, at du besvimer eller taber bevidstheden.

**Du må ikke få ordineret eller få behandling med et i.v.-jernpræparat, hvis:**

- du er allergisk (overfølsom) over for selve præparatet eller andre indholdsstoffer i præparatet.
- du tidligere har været ude for alvorlige allergiske (overfølsomheds-) reaktioner ved behandling med andre i.v.-jernpræparater \*
- du har jernoverskud (for meget jern i kroppen)
- din anæmi ikke skyldes jernmangel

**Fortæl det til lægen, før du får ordineret/behandles med et i.v.-jernpræparat,** hvis du har en af disse former for allergi eller tilstande.

**\* Det er vigtigt at vide, at der kan forekomme en reaktion, også selvom du ikke tidligere har haft problemer med i.v.-jernpræparater.**

**Du kan have en øget risiko for at få en allergisk reaktion, hvis du har:**

- kendte allergier, herunder lægemiddelallergier
- tidligere har haft svær astma, eksem eller andre allergier (f.eks. støv, pollen, skæl fra kæledyr) eller
- nedsat immunforsvar eller betændelsestilstande (f.eks. reumatoid arthritis, lupus erythematosus)

**Fortæl det til lægen, før du får ordineret/behandles med et i.v.-jernpræparat,** hvis du har en af disse former for allergi eller tilstande.

Din læge vil afgøre, om i.v.-jernpræparatet er egnet til dig.